

Nieuwsbrief vleeskuikens

Uitgave van de CAVV Zuid-Oost Salland u.a. 28 juni 2010

Coccidiose

Onlangs hebben wij een wijziging in het coccidiose programma van de vleeskuikenvoeders doorgevoerd. In de Groeikorrel en (aanvullende) Sprintkorrel is in plaats van de Narazin nu de Salinomycine gekomen. Hierover bent u geïnformeerd. Hiermee kunnen wij weer even uit de voeten als nieuwe shuttle. Echter op sommige bedrijven is de opbouw van de weerstand tegen coccidiose anders en om ook hier een goede bescherming te kunnen bieden kan de Groeikorrel net als de Startkruimel ook voorzien worden van de Maxiban voor een maximale bescherming. Overleg met uw dierenarts of voorlichter wat in uw situatie het beste past.

Warmtemaatregelen

Op dit moment zitten we volop in de zomer wat het weer betreft. Daarom is het goed enkele praktische zaken even langs te lopen.

Ga niet te vroeg volop ventileren. Zeker voor de 4 tot 4,5 weken mag er niet volop geventileerd worden, omdat de kuikens beter kunnen wennen aan de warmte en ze later meer problemen kunnen krijgen doordat er geen extra luchtverplaatsing meer is.

Vitamine C wordt door de kuikens bij hogere buiten temperaturen moeilijker benut. Extra verstrekken is een goede preventie tegen een mogelijk tekort. Begin hier vroeg mee op een warme dag. Vitamine C 's morgens vroeg verstrekken en ook belangrijk, in meerdere porties op een dag aanmaken in verband met de beperkte houdbaarheid.

Met vriendelijke groeten,

CAVV Zuid – Oost Salland
R.G.T.M. (Robert) Nijkamp
Stationsweg 4
7448 RR Haarle
Tel. 0548-595662
Fax. 0548-595205
Mob. 06-11459758
Email r.nijkamp@zuidoostsalland.nl
Bezoek ook www.zuidoostsalland.nl

